Wirkstoff

Ausgangssubstanz
(Feststoff)

- > Ist die Korngröße geeignet (mikronisierter Wirkstoff)?
 ja nein
- > Pulverförmig und Teilchen zerkleinernde Vorarbeit notwendig?
 ja nein
- > Einwaagekorrektur erforderlich (Analysezertifikat)?
 ja nein

Ausgangssubstanz
(Fertigarzneimittel)

- > Ist das Präparat zur Weiterverarbeitung geeignet? (Überzüge, Retardierungen etc. beachten!)
 ja nein
- > Reicht die Stückzahl der kleinsten Packungseinheit aus (mind. 10, besser 20!)?
 ja nein

Berechnung der
Wirkstoffmenge

- > Ist eine Umrechnung der Menge auf das vorliegende Salz erforderlich, z. B. von Sildenafil auf Sildenafilcitrat?
 ja nein

Wirkstoffzuschlag

- > Ist ein Wirkstoffzuschlag erforderlich?
 ja nein
- DAC/NRF Empfehlung:
- > 5 % (generell sinnvoll)
 - > 10 % wenn plausibel (z. B. Kapseldosierung <20 mg)
 - > ZL-Erfahrungen: siehe Tabelle

Herstellung

Herstellende
Person

- > Geschult im Herstellungsverfahren und routiniert?
 ja nein

Herstellungs-
ansatz

- > Kapselgröße?
- > Ansatzgröße?
(Empfehlung: Mind. 60 Stück)

Kapselhülle

- > Unverträglichkeit/Instabilität mit Wirkstoff bekannt?
 ja nein
- > Ausreichende Entleerbarkeit gewährleistet (insb. bei Kapseln für die pädiatrische Anwendung)?
 ja nein

Füllmittel

- > Unverträglichkeit/Instabilität mit Wirkstoff bekannt?
 ja nein
- > Partikelgröße geeignet?
 ja nein
- > Mannitol/Aerosil®: Bevorzugt Mannitol 35! Herstellung und Prüfung gemäß NRF S.38. Schüttdichte OK, wenn 0,475 – 0,575 g/ml
- > Andere Füllstoffe: Fließregulierungsmittel zugesetzt?
 ja nein

Welches Verfahren ist geeignet?

- > Gravimetrisches Verfahren (DAC/NRF) bevorzugt!
- > Kalibriermethode (DAC/NRF) (nicht-standardisierte Füllmittel, FAM-Verwendung oder hoher Wirkstoffanteil)
 - Methode A: Wirkstoffanteil > ½ des Kalibriervolumens
 - Methode B: Wirkstoffanteil < ½ des Kalibriervolumens
- > Volumenergänzungsmethode (DAC/NRF)
- > Lösemethode (DAC/NRF) nur für standardisierte Zubereitung

Waage

- > Mindestlast / Mindesteinwaage der verwendeten Waage ausreichend? Passt die Ablesegenauigkeit?
 ja nein
- > Wenn nicht: Einwaage erhöhen oder Verreibung herstellen!
- > Wägeunterlage Material: bevorzugt Hart-PVC, Polystyrol dunkel, um Rückstände zu erkennen

Andere Utensilien

- > Gravimetrisches Verfahren: Schale glatt, ausreichend groß!
 - Wirkstoff + Teil des Füllmittels sandwichartig in die Schale
 - Mischen, mind. 3-mal Abschaben (Kartenblatt: Hart-PVC)
 - restliches Füllmittel zugeben, Mischvorgang wiederholen
- > Kalibriermethode: Schale glatt, ausreichend groß!
 - Messzylinder für Kalibriervolumen < 2,5-fache des Gesamtfüllvolumens aller herzustellenden Kapseln